

ПАМ'ЯТКА ПАЦІЕНТІВ

Підготовка пацієнта к ПЭТ дослідженню с ^{18}F -ФДГ

1. Пацієнти, страждаючі діабетом 1 типу, обстежуються натощак утрім. Введення інсуліна перед ПЭТ не рекомендується.
2. Пацієнти, страждаючі діабетом 2 типу, перед дослідженням можуть приймати препарати групи бігуанідів (метформин) і тiazолідиндіонів (росиглітазон). Протипоказан прийом препаратів групи сульфанілмочевини.
3. За сутки до і в день дослідження уникати надмірних фізических нагрузок.
4. За сутки до дослідження виключити із їщевого раціону углеводи (см. рекомендації по їтанню).
5. За 24-48 годин до дослідження виключити ужиття алкогюля і алкогюль - содержачих лікарств (спиртові медическі настюйки)
6. Дослідження виконюється натощак. Длительність голоданя в день дослідження - не менше 4 годин до введення радіофармпрепарата (РФП).
7. Для дослідження потрібно вибрати комфортню, теплюю одюжду (в холодне время года).
8. На теле і одюжді не должно буть металлеских предметів.
9. В день сканювання пацієнту рекомендується пить несладкую негазірованню воду в любом количесстві. Не позднее, чем за **1 годин до моменту процедури введення РФП**, следует выпить не менше 0,5-0,7 л воды. Остальное – после проведения процедуры для ускорения выведения РФП.
10. Для предотвращения накопления РФП в мышцах, до начала процедуры, после введения препарата, пацієнту следует соблюдать полный физический и эмоциональный покой
11. Перед началом процедуры сканювання необходимо опорожнить мочевой пузырь.
12. В ПЭТ-центре нужно буть за 30 минут до назначенного времени!
13. Если по каким-либо причинам Вы не можете приехать или опаздываете - обязательно перезвоните и предупредите нас!
14. Рассчитывайте, что в день исследования вы проведете в ПЭТ-центре около 4-4,5 часов!
❖ **С СОБОЙ:** необходимо принести не менее 2 литров воды (не сладкой не газированной минеральной либо кипяченой) для выведения РФП после исследования.

ВАЖНО: Для адекватной интерпретации данных допустимый уровень сахара в крови < 8,32 ммоль/л.

8 (4 212) 40-95-04
реєстратура